



Schaapjes tellen

De levenscyclus van het schaap

Een schaap is een kuddedier. Het is een planteneter of herbivoor. Bovendien behoort het tot de herkauwers zoals het rund, de geit en het hert. Dit betekent dat een schaap het opgenomen voeder uit de pens, de grootste van de vier magen, terug in de muil brengt om het nog eens te verkleinen, waarna de eigenlijke vertering in de andere drie magen kan beginnen.



8 In de meimaand worden de schapen geschoren. Een schaap produceert 3 tot 5 kg wol per jaar.

- 1 In ons klimaat is het de gewoonte dat de bronst, dit is een periode van maximum drie dagen waarin de ooi vruchtbaar is, het duidelijkst is tussen september en januari. In die periode wordt de ram bij de ooiën gebracht om de bevruchting tot stand te brengen.
- 2 De draagtijd bedraagt 146 dagen. Wanneer de lammerperiode zich aankondigt, worden de schapen opgestald. Het stalmenu bestaat uit hooi (gedroogd gras), gehakselde maïs, bietenpulp en grasklaverkuil.
- 3 In het voorjaar werpt een ooi 1 tot 3 lammetjes, waarvan het gewicht kan variëren tussen 2 en 4 kg. Al na enkele minuten kunnen de lammetjes lopen. Kort na de geboorte krijgen de lammeren biest te drinken. Dit is de eerste moedermelk die een hoog gehalte aan makkelijk verteerbare voedingsstoffen en antistoffen bevat die het lichaam weerstand geven. Na de geboorte verblijven de ooi en haar lammetjes twee dagen in een kraamhok.
- 4 De volgende 80 dagen blijven ze samen. Daarna worden de lammetjes gespeend en moeten ze het verder zonder melk stellen. De ooiën komen dan droog te staan.
- 5 In het voorjaar verhuizen de schapen naar dijken of natuurgebieden, waar ze als graasmachines nuttig werk leveren.
- 6 De oilammeren vertrekken naar andere bedrijven om daar als fokmateriaal te worden ingezet. Na negen maanden kunnen ze een eerste maal gedekt worden. Ze wegen dan 50 kg.



7 De ramlammeren verlaten het bedrijf zodra ze slachtrijp zijn bij een gewicht van 35 tot 45 kg.

