


# Vooruit met de geit!

## De levenscyclus van de geit


We vinden al tekenen van domesticatie van de geit rond 8000 voor Christus. In het Zagrosgebergte in het Nabije Oosten vond men resten die er op wijzen dat ze werden gehouden als huisdier.

De vruchtbare periodes (2 à 3 bronstcycli) doen zich, bij geiten in ons klimaat, voor tussen september en januari. Dan wordt de bok bij de geiten gebracht om ze te dekken (bevruchten).




**bok**  
± 70 kilogram

**geit**  
± 60 kilogram





De draagtijd bij een geit duurt zo'n 150 dagen. Ze moet eerst gelammerd hebben voordat ze melk geeft. Net zoals bij elk zoogdier.




In het voorjaar worden er één tot drie lammetjes geboren waarvan het gewicht kan variëren tussen 2,5 en 3,5 kg.

Kort na de geboorte krijgen de lammeren biest te drinken uit een fles. Die heeft een hoog gehalte aan makkelijk verteerbare voedingsstoffen en antistoffen. De geit wordt twee maal per dag gemolken.



De eerste weken krijgen de lammeren driemaal daags melk te drinken waarna er langzaam wordt overgeschakeld op hooi en krachtvoer.

Na 32 weken wegen jonge geiten ±35 kg en worden ze voor de eerste keer gedekt. Een melkgevende geit produceert ± 3 liter melk per dag. Daarvan wordt allerlei lekkers gemaakt zoals kaas of ijs.



De jonge bokken verlaten het bedrijf als ze een paar dagen oud zijn.

